

**Afrykański pomór świń** – (ang. African swine fever, ASF) – wybitnie zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa, występująca w warunkach naturalnych u świń domowych różnych ras i u dzików, niezależnie od wagi, wieku, płci Choroba nie atakuje ludzi. Wystąpienie przypadków tej choroby jest przyczyną poważnych strat ekonomicznych związanych z padnięciami zwierząt, wypłatą odszkodowań a przede wszystkim wstrzymaniem obrotu i eksportu świń oraz artykułów żywnościowych wyprodukowanych z mięsa wieprzowego.

W Polsce nigdy dotychczas nie rejestrowano przypadków tej choroby, lecz ze względu na wystąpienie afrykańskiego pomoru świń w rejonach północno-zachodnich Rosji, istnieje realna możliwość dotarcia choroby na terespolski, przyległy do wschodniej granicy.

### **Podstawowe objawy**

Stożenie śmiertelności zależy od postaci choroby. W postaci ostrej śmiertelność dochodzi do 100%.

- *zwierzę niechętnie się porusza i często pokłada,*
- *ma wysoką temperaturę (41 – 42<sup>0</sup>C), przy zachowanym apetycie,*
- *sine plamy i wybroczyny na uszach, ryju i kończynach,*
- *mogą występować wysięki z nosa i oczu,*
- *wymioty,*
- *krwawa biegunka.*

Choroba trwa przez 1-7 dni. Mogą występować poronienia. W mniej ostrej postaci objawy są podobne, choć łagodniejsze, i trwają dłużej (aż do 3-4 tygodni).

### **Rozprzestrzenianie się**

Wirus jest rozprzestrzeniany w wyniku bezpośredniego kontaktu z zarażonymi świnią, dzikami lub ozdrowieńcami. Może dotrzeć na znaczne odległości poprzez środki transportu

### **Wrażliwość wirusa**

Wirus jest bardzo odporny, przeżywa w szerokim zakresie pH ( 4 -13) i temperatur, w tym w temperaturach poniżej 0<sup>0</sup>C. Może przetrwać w zakażonych kojcach dla świń przez co najmniej jeden miesiąc, a także przetrwać przez wiele miesięcy w surowym, nie przetworzonym mięsie. Świnie mogą pozostawać nosicielami wirusa, nawet przez całe życie. Wysoka temperatura niszczy go szybko.

### **Strategia kontrolowania choroby**

Strategia walki z chorobą polega na zlikwidowaniu wirusa w jak najkrótszym możliwym czasie. Obejmuje to zabicie i utylizację zwierząt chorych, ścisłą kwarantannę i kontrolę przemieszczania się zwierząt, ludzi, produktów i sprzętu, czyszczenie i dezynfekcję skażonych pomieszczeń i sprzętu, prowadzenie dochodzenia epizootycznego, perlustracji mających na celu określenie zasięgu choroby oraz tworzenie stref dla oddzielenia obszarów zapowietrzonych i wolnych od choroby.

**Brak szczepionki przeciwko ASF.**

***Hodowco !***

***Zgłaszaj natychmiast chore lub padłe świnię do  
najbliższego Gabinetu Weterynaryjnego***

***lub Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Hajnówce - tel. 85 682 25 96***